

AVIS ALLERGOLOGIQUE
RDVAllergo@chu-grenoble.fr

UNIQUEMENT SI LES 2 CONDITIONS SUIVANTES SONT REUNIES

ANTECEDENT DE
REACTION SEVERE DE TYPE CHOC ANAPHYLACTIQUE*

** Les œdèmes isolés ne sont pas des anaphylaxies*

+

APRES ADMINISTRATION DE

- MACROGOL

- Ou LAVEMENT POUR COLOSCOPIE

- Ou MEDICAMENT INJECTABLE ou VACCIN CONTENANT
POLYETHYLENE GLYCOL (PEG) ou POLYSORBATE ou TROMETAMOL**

***Les réactions même sévères après prise de médicaments oraux autre que le
Macrogol, ne sont pas une contre-indication à la vaccination.*

DANS TOUS LES AUTRES CAS:

VACCINATION AUTORISEE SANS AVIS
ALLERGOLOGIQUE

Les précautions suivantes peuvent être proposées:

- *Surveillance de 30 min si antécédent de choc anaphylactique*
- *Prémédication par antihistaminique si antécédents d'urticaire, d'œdème ou de mastocytose
(Par exemple 2 cp, 30 min avant le vaccin)*

En cas d'antécédent de choc anaphylactique à un produit de contraste iodé ou gadoliné, la vaccination anticovid est possible avec les vaccins Pfizer, Astrazeneca ou Johnson et Johnson. Le vaccin Moderna doit être évité.